

Module 9 : Violences sexuelles

jeudi 19 mai 2022





Infectiologie, migration et violences sexuelles

Claire Tantet

Dispositif Parcours

Services de maladies infectieuses et tropicales

Hôpital Avicenne et hôpital Bichat

Situations cliniques

AES

PREP

Mme N.



Hospitalisation

Tuberculose

Mme BA.

Consultation

Suivi VIH

Mme F.

Médecine des
voyages

Vaccination FJ

Aminata

Définition

● Violence

Usage délibéré ou menace d'usage délibéré de la force physique ou de la puissance contre soi-même, contre une autre personne ou contre un groupe ou une communauté, qui entraîne ou risque fort d'entraîner un traumatisme, un décès, un dommage moral, un mal développement ou une carence

● Basées sur le genre

- Violences à l'égard des femmes
- Violences sexuelles
- Violences liées à l'orientation sexuelles et à l'identité de genre

● En lien avec le parcours migratoire

- Motif d'exil
- Sur la route
- A l'arrivée en France

Le nombre de déplacés et réfugiés dans le monde a doublé en 10 ans

- Aujourd'hui, 1% de l'humanité est déplacée

82,4 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur ou à l'extérieur de leur pays

Augmentation de 4% par rapport au record de 79,5 millions fin 2019

- 9 réfugié.es sur 10 sont accueilli.es dans les pays en développement

- Les enfants de moins de 18 ans représentent 42% des personnes déplacées de force

Entre 2018 et 2020, un million d'enfants sont nés réfugié.es

- 48% des personnes déplacées sont des femmes

Motifs d'exil

- Crise humanitaire et viols de guerre
- Mutilations génitales féminines (MGF)
- Mariage forcé, lévirat
- Discrimination liée au VIH
- Homophobie
-

Mariages forcés

Exposition aux violences domestiques

Arrêt de la scolarité

Grossesse précoce

Isolement de la famille et de la communauté

QUI EST CONCERNÉ ?

Environ **21 %** des jeunes femmes dans le monde ont été mariées avant leur 18e anniversaire.

21 %



650 000 000

650 millions de filles et de femmes actuellement en vie ont été mariées alors qu'elles étaient enfant.



12

millions de jeunes filles de moins de 18 ans sont mariées chaque année.

Violences sexuelles

- Les conséquences de l'exposition à la violence sont aussi vastes que celles de la violence elle-même
 - Santé mentale: dépression, anxiété, conso de toxiques, comportements suicidaires
- Physiques: maladies aiguës et chroniques
 - Santé sexuelle et reproductives: grossesses non désirées, IST, IVG non médicalisées
- Stigmatisation, ostracisme communautaire et familial

Viols de guerre

- Acte de viols commis dans un contexte de guerre ou de conflit
 - Arme de guerre efficace
 - Détruit la personne, la famille et la communauté
- Ukraine, Tigré, Syrie, République Démocratique du Congo, Soudan, Sierra Leone...

Fondation Panzi



- Soins physiques
- Assistance légale
- Support psychosocial
- Réintégration communautaire

Fistules et prolapsus

Type I Brusing and superficial abrasions, and cutaneous and subcutaneous lesions without muscle or sphincter damage.	 	
Type II Cutaneous and musculoskeletal damage of the perineal body without fecal or urinary incontinence.	 	
Type III Cutaneous, musculoskeletal, and sphincter damage with fecal incontinence.	 	
Type IV Stellate cutaneous and musculoskeletal trauma with bladder and anal sphincter damage resulting in fecal and urinary incontinence.	 	
Type V Rupture of the posterior vagina into the posterior cul-de-sac (pouch of Douglas) with protrusion of abdominal contents.	 	

En cas de crise humanitaire

- Montée de la violence et de l'insécurité
- Mobilité réduite
- Moins d'accès aux soins et à l'alimentation
- Augmentation de la charge de travail: soins des enfants et personnes âgées

Mortalité maternelle

- Reflet de l'inégalité d'accès aux soins
 - 99% dans un pays en voie de développement: 1/2 en Afrique sub saharienne et 1/3 en Asie du Sud
- Environ 830 femmes meurent chaque jour dans le monde du fait de complications liées à la grossesse ou à l'accouchement
 - La majeure partie de ces décès se sont produits dans des pays à revenu faible et la plupart auraient pu être évités

Accès à l'IVG




25 millions d'IVG non sécurisées pratiquées dans le monde chaque année soit 45% des IVG:

31% moins sécurisés (soignant qualifié utilisant une méthode à risque ou dépassée comme celle par dilatation et curetage, ou une personne non qualifiée même avec une méthode sûre telle que l'administration de misoprostol)

14% moins sûrs (personnes non qualifiées à l'aide de méthodes dangereuses comme l'introduction d'objets et l'utilisation de préparations à base de plantes)

Les décès dus à des complications sont élevés dans les régions notamment par IVG incomplète, hémorragie, traumatisme du vagin, du col ou de l'utérus, infections.





Facteurs de risque d'exposition aux violences sexuelles:

Parcours migratoire complexe

- Classe sociale
- Mode de financement du voyage
- Voyage seul.e, avec enfant, avec accompagnant
- Mode de transport utilisé
- Durée du voyage
- Pays traversés et leur nombre
- Stop dans un camp ou la forêt ou le désert ou en prison

Violences sexuelles et infection VIH

Augmentation des violences sexuelles ou physiques chez les patientes VIH+ (+29%)

The association between violence against women and HIV: evidence from a national population-based survey in Zimbabwe, Nyamayemombe et al.,

Prepublication Zimbabwe Working Papers, 2010.

Augmentation des comportements sexuels à risque dans les années qui suivent les violences sexuelles

Adverse childhood experience and sexual risk behaviours in women: a retrospective cohort study, Hiilis SD et al.,

Family Planning Perspectives, 2001, 33(5):206-211.

Les violences représentent un obstacle à l'accès aux soins chez les patientes VIH+

Intimate partner violence and health care-seeking patterns among female users of urban adolescent clinics.

Miller E et al., Maternal and Child Health Journal, 2009, 14(6): 910-917.

Facteurs de risque d'exposition aux violences sexuelles :

A l'arrivée en France

- Logement et conditions d'hébergement
- Rue ou non
- Statut administratif
- Langue, lecture et écriture
- Connaissances
- Travail du sexe
- Consommation de produits
- Couverture santé

Migration et infection VIH

- 35% des 898 adultes infectés VIH nés dans un pays d'Afrique subsaharienne ont acquis le VIH après leur arrivée en France
- Avoir subi des violences sexuelles expose à un risque plus élevé de transmission du VIH (15,3% VIH+ *versus* 3,2% VIH-)
- Les violences sexuelles subies en France sont 4 fois plus fréquentes chez les femmes qui ont contracté le VIH après la migration

Prevalence and circumstances of forced sex and post-migration HIV acquisition in sub-Saharan African migrant women in France: an analysis of the ANRS-PARCOURS retrospective population-based study, Julie Pannetier and al, Lancet Public Health 2018, Vol 3 January 2018




Figure: Pathways through which gender-based violence and gender and relationship power inequity might place women at risk of HIV infection

Intimate partner violence and health care-seeking patterns among female users of urban adolescent clinics. Miller E et al., Maternal and Child Health Journal

Comment aborder le sujet des violences ?

Les focus groupes

- En avez-vous déjà parlé à des professionnel.les de santé?
Comment c'était?
- Qu'est-ce que vous attendez des professionnel.les sur ce sujet?
- Quand? Comment et dans quel lieu?

« Ça sert à rien de fermer les yeux parce que c'est être complice de... »

« Mais déjà qu'il parle s'il le voit... Franchement, s'il voit quelque chose il faut qu'il en parle. C'est comme s'il voit une femme, il ausculte une femme, il voit qu'elle a des bleus, des marques et tout, il va pas venir et absolument rien dire sur ça. Il va forcément dire au moins un minimum : « Ça va à la maison ? Je vois que vous avez des marques, qu'est-ce qui se passe ? » »

« Si on n'enlève pas ce tabou-là en parlant et en se disant réellement ce qu'il faut faire, c'est des pratiques qui vont jamais s'arrêter. »

« C'est pas comme si je me sentais pas à l'aise, mais j'étais un peu gênée. Lui s'est mis à l'aise, donc moi aussi, je me suis »

Un message clé

Briser le silence

« Parce que moi chez moi, c'était tabou, on pouvait pas en parler.

Mais chez vous en France, c'est encore plus tabou on dirait !

J'ai accouché ici 3 fois et personne m'en a jamais parlé ! »



*Photographie issue de
l'atelier thérapeutique
Graphico-photo,
animé par l'artiste
Chloë Alienor, destinée
à l'exposition des
patientes :
« Les Amazones
d'Avicenne »*