CABOTEGRAVIR longue durée action (LA)
RILPIVIRINE longue durée action (LA)
Données en vie réelle

Dr SEANG Sophie
Infectiologue, Hôpital Pitié-Salpêtrière

Q1. Le cabotegravir et la rilpivirine longue durée d'action peuvent être administrés:

A. En sous cutané

B. En intramusculaire

C. Au niveau ventro glutéal

D. Au niveau postéro glutéal

E. En intraveineux

Q1. Le cabotegravir et la rilpivirine longue durée d'action peuvent être administrés:

A. En sous cutané

B. En intramusculaire

C. Au niveau ventro glutéal

D. Au niveau postéro glutéal

E. En intraveineux

3ml pour chaque injection

Q2. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont vraies:

A. Le cabotégravir LA nécessite une conservation à température entre 2° et 8°

B. La rilpivirine LA nécessite une conservation à température entre 2° et 8°

C. Le cabotégravir LA et la rilpivirine LA doivent être utiliser dans les 2h après reconstitution

D. Avant administration les produits doivent être ramenés à température ambiante (15 mn)

Q3. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont vraies:

A. Le cabotégravir LA nécessite une conservation à température entre 2° et 8°

B. La rilpivirine LA nécessite une conservation à température entre 2° et 8°

C. Le cabotégravir LA et la rilpivirine LA doivent être utiliser dans les 2h après reconstitution

D. Avant administration les produits doivent être ramenés à température ambiante (15 mn)

La stabilité physicochimique dans les conditions d'emploi a été démontrée pendant 2 heures à 25 °C.

Q4. Votre patiente souhaite bénéficier d'une bithérapie de Cabotégravir 600mg LA et Rilpivirine 900mg LA, quels aspects vous semble t-il important d'évaluer?

- A. La réelle motivation pour la mise en place de ce TARV injectable**
- B. La compréhension de ce traitement ARV curatif**
- C. La compréhension du schéma des injections**
- D. Ses projets de vie**
- E. Les comédications**

Q4. Votre patiente souhaite bénéficier d'une bithérapie de Cabotégravir 600mg LA et Rilpivirine 900mg LA, quels aspects vous semble t-il important d'évaluer?

A. La réelle motivation pour la mise en place de ce TARV injectable

B. La compréhension de ce traitement ARV curatif

C. La compréhension du schéma des injections

D. Ses projets de vie grossesse? voyages?

E. Les comédications

Q5. Votre patiente souhaite bénéficier d'une bithérapie de Cabotégravir 600mg LA et Rilpivirine 900mg LA, quels paramètres devez vous prendre en compte?

- A. Antécédent de réplication sous INI/NNRTI**
- B. Génotypes de résistance antérieurs (mutation aux INI et/ou NNRTI)**
- C. Sous type VIH**
- D. Indice de masse corporelle**
- E. Charge virale VIH indétectable depuis > 6mois**
- F. Statut hépatite B**

Q5. Votre patiente souhaite bénéficier d'une bithérapie de Cabotégravir 600mg LA et Rilpivirine 900mg LA, quels paramètres devez vous prendre en compte?

A. Antécédent de réplication sous INI/NNRTI

B. Génotypes de résistance antérieurs (mutation aux INI et/ou NNRTI)

C. Sous type VIH

D. Indice de masse corporelle

E. Charge virale VIH indétectable depuis > 6mois

F. Statut hépatite B

Analyse multivariée : paramètres associés à l'échec virologique à S48

	Modèle final : OR (IC ₉₅)
Présence de mutations associées à la résistance à RPV à l'inclusion (liste IAS-USA 2019)	37,24 (8,44 - > 99), p < 0,001
Log ₂ de la concentration plasmatique résiduelle de RPV à S8	4,17 (1,59 - 11,11), p = 0,004
Sous-type A6/A1 VIH-1	6,59 (1,82 - 25,26), p = 0,005
IMC (kg/m ²) à l'inclusion	1,13 (1,03 - 1,25), p = 0,014

La combinaison d'au moins 2 des FDR = risque accru échec virologique

Margolis, CROI, 2021

Réunion de concertation pluriprofessionnelle++++

Q6. Parmi les propositions suivantes, lesquelles vous paraissent utiles?

- A. Masser le site d'injection pour diminuer la douleur au point d'injection**
- B. Surveillance post injection à réaliser 15-20min**
- C. Informer sur l'importance du respect des dates de RDV d'injections à venir (ETP)**
- D. Proposer un calendrier de suivi (ETP)**

Q6. Parmi les propositions suivantes, lesquelles vous paraissent utiles?

- A. Masser le site d'injection pour diminuer la douleur au point d'injection**
- B. Surveillance post injection à réaliser 15-20min**
- C. Informer sur l'importance du respect des dates de RDV d'injections à venir (ETP)**
- D. Proposer un calendrier de suivi (ETP)**

Et plus fréquents :

- Douleurs au site d'injection (76%)
- Diminution des douleurs avec le temps++

JOUR PRÉVU POUR L'INJECTION
Fenêtre de flexibilité de ± 7 jours

L	M	ME	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Données pharmacologiques

	Cabotegravir	Rilpivirine
Absorption, T_{max} médian	7 jours	3 - 4 jours
Demi-vie d'élimination, $t_{1/2}$ moyen	5,6 - 11,5 semaines	13 - 28 semaines
Voies de métabolisation	UGT1A1 UGT1A9 (minoritaire)	CYP3A

Distribution du cabotegravir et de la rilpivirine

Basées sur les données *in vitro*, le cabotegravir et la rilpivirine se lient fortement aux protéines plasmatiques (> 99 % et 99,7 % respectivement).

Données de vie réelle de l'hôpital à la ville des PVVIH sous CABOTEGRAVIR (CAB) /RILPIVIRINE (RPV) longue durée d'action (LA)

S. Seang^{1,2}, C. Palacios^{2,3}, N. Valin^{2,4}, A. Gansou^{2,4}, A. Fayçal^{1,2}, B. Abdi¹, S. Lambert-Niclot⁴, L. Lenclume^{1,2}, R. Agher^{1,2}, M. Hamidi^{2,3}, A. Adda^{2,3}, M. Ohayon^{2,5}, D. Gosset^{2,5}, P. Passe Pajaud Coutrin¹, J-P Vincensini^{2,6}, C. Katlama^{1,2,7}, G. Pialoux^{2,3,7}, K. Lacombe^{2,4,7}, V. Pourcher^{1,2,7}, M-A Valantin^{1,2}

1. CHU Pitié Salpêtrière, Paris, France, 2. COREVIH Ile de France -Centre 3. CHU Tenon, Paris, France, 4. CHU Saint Antoine, Paris, France, 5. Centre 190, Paris, France, 6. Maison Médicale Chemin Vert, Paris, France 7. Sorbonne Université, Paris, France

- Etude descriptive prospective
- Cohorte de PVVIH ayant initié un TARV par CAB/RPV LA entre **Janvier 2022 et Décembre 2022** (Paris, France)
- Contact patient via ETP. Recueil de données via logiciels médicaux
- **Objectif principal:** Evaluer la **transition hôpital(H)- ville(V)** (proportion de passage en ville à M5) et le **maintien de la stratégie CAB/RPV en ville à 1 an.**

**Echec de la stratégie en ville
= retour à l'hôpital ou arrêt des injections**

Données de vie réelle de l'hôpital à la ville des PVVIH sous CABOTEGRAVIR (CAB) /RILPIVIRINE (RPV) LA

TOTAL n=283

Homme, n (%)	239 (84)
Age, années (médiane, IQR)	44 (37-54)
IMC > 30kg/m², n (%)	15 (5)
Pays de naissance, n (%)	
- Europe	179 (63)
- Afrique	72 (25)
- Autres	32 (11)
FDR de transmission VIH, n (%)	
- Homosexuel	191 (67,5)
- Hétérosexuel	60 (21)
- Autres	32 (11,5)
Durée infection VIH, années (médiane, IQR)	11 (7-18)
NADIR CD4 /mm³ (médiane, IQR)	332 (181-474)
Sous type viral A1/A6, n (%) (n=248)	2 (0.8)
CV <50cp/mL au J0, n (%) (n=277)	270 (97%)
CD4 J0, /mm³ (médiane, IQR)	674 (534-852)
Stratégie ARV avant J0, n (%)	
Bithérapie	89 (32)
Trithérapie	194 (68)
Phase orale CAB/RPV, n (%)	92 (32)

Questionnaires motivations
(n= 229)

Questionnaires parcours VILLE
- Qui ? (n= 175)
- Où? (n= 166)
- Comment ? (n=138)

- via réseau hospitalier
- via centre de santé
- via programme d'accompagnement PVVIH
- MG
- via pharmacie de quartier
- autres
- via annuaire

- Centre de santé (CdS)
- Cabinet IDE
- A domicile
- MG
- Autres

Données de vie réelle de l'hôpital à la ville des PVVIH sous CABOTEGRAVIR (CAB) /RILPIVIRINE (RPV) LA

ANALYSE GLOBALE DES ARRETS
Au 1^{er} Sept 2023, parmi les 141 PVVIH ayant atteint 1 an de suivi, 27 patients ont arrêté CAB/RPV LA.

MOTIFS D'ARRET	Arrêt de CAB /RPV LA n=27	Durée CAB RPV LA	Suivi
Réplication virale * 2CV > 50cp/mL à 2s d'intervalles	7 (26%)	1mois, 2mois (2), 3mois (2), 5mois (2)	Arrêts précoces
Effets indésirables (n=11)			
- Douleurs site injection	7 (26%)	2mois, 3mois, 5mois (2), 6 mois, 7mois, 10mois	Arrêts précoces (3), H(2), Ville(2)
- Vertiges	1 (3,5%)	10mois	Arrêts précoces
- Stress	1 (3,5%)	1 mois	Hôpital
- Prise pondérale	2 (7%)	5 mois 8 mois, 10mois	Ville
Grossesse	3 (11%)	1 mois, 3mois, 12 mois	Arrêts précoces (2), Ville (1)
Raisons personnelles	5 (18,5%)	3 mois (2), 5 mois, 9 mois (2)	Arrêts précoces (3), Ville (2)
Syndrome polyuropolydipsique	1 (3,5%)	3 mois	Arrêt précoce